

# Edades de Vacunación 2023

La vacuna contra el COVID-19 se recomienda a partir de los 6 meses de edad.



**Al Nacer**

**HepB**  
(Hepatitis B)

Edad de **0 a 2** meses

**DTaP**  
(Difteria, tétanos y tos ferina)

**Polio**  
(IPV)

**HepB**  
(Hepatitis B) 1-2 meses

**Hib**  
(Meningitis por Hib)

**PCV**  
(Neumonía)

**RV**  
(Rotavirus)

Edad **4** meses

**DTaP**  
(Difteria, tétanos y tos ferina)

**Polio**  
(IPV)

**Hib**  
(Meningitis por Hib)

**PCV**  
(Neumonía)

**RV**  
(Rotavirus)

Edad **6** meses

**DTaP**  
(Difteria, tétanos y tos ferina)

**Polio**  
(IPV)

**HepB**  
(Hepatitis B)

**PCV**  
(Neumonía)

**RV**  
(Rotavirus)

Edad **12** meses

**HepA**  
(Hepatitis A)

**MMR**  
(Sarampión, paperas y rubéola)

**Hib**  
(Meningitis por Hib)

**PCV**  
(Neumonía)

**Varicela**  
(Peste cristal)

Edad **15** meses

**DTaP**  
(Difteria, tétanos y tos ferina)

Edad **18** meses

**HepA**  
(Hepatitis A)

Edad de <b>4 a 6</b> años	Edad de <b>11 a 12</b> años	Edad de <b>16 a 18</b> años
<b>DTaP</b> <b>Polio</b> (IPV) <b>MMR</b> <b>Varicela</b>	<b>TDaP</b> <b>HPV</b> (2 dosis) <b>MenACWY</b> (Meningitis)	<b>MenACWY</b> (Meningitis) <b>MenB</b>

Pregunte a su doctor cuánto tiempo debe pasar entre cada vacuna. Para obtener más información, visite [www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines).

Las escuelas de California exigen que algunos niños reciban las vacunas contra el COVID-19. Este requisito está sujeto a cambios. Por favor visite [www.ShotsForSchool.org](http://www.ShotsForSchool.org) para consultar la información más actual.

## Vacuna contra la gripe cada otoño

Todas las personas de 6 meses en adelante deben recibirla.



**NIÑOS DE CALIFORNIA**  
Ámelos. Vacúnelos.