

Edades de Vacunación 2023

Al Nacer

HepB
(Hepatitis B)

Edad de **0 a 2** meses

DTaP
(Difteria, tétanos y tos ferina)

Polio
(IPV)

HepB
(Hepatitis B) 1-2 meses

Hib
(Meningitis por Hib)

PCV
(Neumonía)

RV
(Rotavirus)

Edad **4** meses

DTaP
(Difteria, tétanos y tos ferina)

Polio
(IPV)

Hib
(Meningitis por Hib)

PCV
(Neumonía)

RV
(Rotavirus)

Edad **6** meses

DTaP
(Difteria, tétanos y tos ferina)

Polio
(IPV)

HepB
(Hepatitis B)

PCV
(Neumonía)

RV
(Rotavirus)

Edad **12** meses

HepA
(Hepatitis A)

MMR
(Sarampión, paperas y rubéola)

Hib
(Meningitis por Hib)

PCV
(Neumonía)

Varicela
(Peste cristal)

La vacuna contra el COVID-19 se recomienda a partir de los 6 meses de edad.



Edad de 4 a 6 años	Edad de 11 a 12 años	Edad de 16 a 18 años
DTaP Polio (IPV)	TDaP HPV (2 dosis)	MenACWY (Meningitis)
MMR Varicela	MenACWY (Meningitis)	MenB

Edad **15** meses

DTaP
(Difteria, tétanos y tos ferina)

Edad **18** meses

HepA
(Hepatitis A)

Pregunte a su doctor cuánto tiempo debe pasar entre cada vacuna. Para obtener más información, visite www.cdc.gov/vaccines.

Las escuelas de California exigen que algunos niños reciban las vacunas contra el COVID-19. Este requisito está sujeto a cambios. Por favor visite www.ShotsForSchool.org para consultar la información más actual.

Vacuna contra la gripe cada otoño

Todas las personas de 6 meses en adelante deben recibirla.



NIÑOS DE CALIFORNIA
Ámelos. Vacúnelos.