

Who Needs an Additional or Booster COVID-19 Vaccine?

Currently, CDPH is recommending an Additional Pfizer/Moderna dose or a Booster Pfizer Moderna or J&J dose of vaccine for certain individuals.

Based on self-attestation, individuals eligible for the booster include:

<p>ADDITIONAL PFIZER/MODERNA DOSE</p> <p>(at least 28 days after Pfizer/Moderna primary series)</p>	<p>PFIZER BOOSTER DOSE (at least 6 months after Pfizer primary series)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pfizer ➤ Moderna (0.25 ml) ➤ J & J 	<p>MODERNA BOOSTER DOSE (at least 6 months after Moderna primary series)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moderna (0.25 ml) ➤ Pfizer ➤ J & J 	<p>J&J BOOSTER DOSE (at least 2 months after 1st J&J)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moderna (0.25 ml) ➤ Pfizer ➤ J & J
<p>Received:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Organ transplant and are taking medicine to suppress the immune system ▶ Stem cell transplant within the last 2 years or are taking medicine to suppress the immune system <p>Actively have:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cancer and receiving treatment for tumors or cancers of the blood ▶ Moderate or severe primary immunodeficiency (such as DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome) ▶ Advanced or untreated HIV infection ▶ Active treatment with high-dose corticosteroids or other drugs that may suppress your immune response 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 65+ ▶ 18-64 years of age with high risk for occupational or institutional exposure. This includes: <ul style="list-style-type: none"> ✓ healthcare workers ✓ first responders ✓ teachers/school staff ✓ day care staff ✓ grocery workers ✓ agricultural workers ✓ workers in homeless shelter ✓ prison/jail/correctional staff ✓ staff in SNF or LTCF ✓ manufacturing workers ✓ U.S. Postal Service workers ✓ public transit workers ▶ 18-64 years of age with a medical condition from the list below: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cancer ✓ Chronic kidney disease ✓ COPD, including asthma ✓ Dementia ✓ Type 1 or Type 2 Diabetes ✓ Downs Syndrome ✓ Coronary Artery Disease including: Heart Failure/Cardiomyopathies ✓ HIV Infection ✓ Primary Immunodeficiency Diseases (i.e. Wiskott-Aldrich, Benta, ALPS) ✓ Overweight ✓ Pregnant and recently pregnant people (for at least 42 days following end of pregnancy) ✓ Sickle cell disease or thalassemia ✓ Smoking, current/former ✓ Stem cell transplant within the past 2yrs ✓ Stroke or cerebrovascular disease 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ All individuals 18+ who <u>only</u> received 1 dose of J&J Covid vaccine 	

People should talk to their healthcare provider about their medical condition, and whether getting an additional dose is appropriate for them. Patients can choose to mix and match COVID-19 booster vaccine doses, utilizing the booster dose time frame from their original series.

¿Quién necesita una vacuna adicional contra el COVID-19?

Actualmente, CDPH está recomendando una dosis adicional de Pfizer / Moderna o una dosis de refuerzo de Pfizer, Moderna o J&J para ciertas personas.

Basado en la auto-atestiguación, los individuos elegibles para el elevador de voltaje incluyen:

DOSIS ADICIONAL DE PFIZER/MODERNA (al menos 28 días después de la serie primaria Pfizer/Moderna)	DOSIS DE REFUERZO DE PFIZER (al menos 6 meses después de la serie primaria de Pfizer)	DOSIS DE REFUERZO DE MODERNA (al menos 6 meses después de la serie primaria de Moderna)	DOSIS DE REFUERZO DE J&J (al menos 2 meses después del 1er J&J)
<p>Recibiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Un trasplante de órgano y toma la medicina para suprimir el sistema inmunológico ▶ Trasplante de células madre en los últimos 2 años o está tomando medicamentos para suprimir el sistema inmunitario <p>Activamente tienes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ El cáncer y recibe el tratamiento por tumores o cánceres de la sangre ▶ Inmunodeficiencia primaria moderada o severa (como síndrome DiGeorge, síndrome de Wiskott-Aldrich) ▶ Infección de VIH avanzada o no tratada ▶ El tratamiento activo con corticosteroides de dosis alta u otras medicinas que pueden suprimir su respuesta inmunitaria 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 65+ ▶ 18-64 años con alto riesgo de exposición ocupacional o institucional. Esto incluye: <ul style="list-style-type: none"> ✓ healthcare workers ✓ primeros respondedores ✓ profesores/personal escolar ✓ personal de guardería ✓ trabajadores de comestibles ✓ trabajadores agrícolas ✓ trabajadores de refugios para personas sin hogar ✓ prison/jail/correctional staff ✓ trabajadores de hogar de ancianos o de instalación a plazo largos ✓ trabajadores industriales ✓ Trabajadores del servicio postal ✓ trabajadores de tránsito públicos ▶ 18-64 years of age with a medical condition from the list below: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cáncer ✓ Enfermedad de riñón crónica ✓ EPOC, incluso asma ✓ Demencia ✓ Diabetes tipo 1 o 2 ✓ Síndrome de Down ✓ Enfermedad de Arteria coronaria incluso: Paro Cardíaco o cardiomiopatías ✓ Infección de VIH ✓ Enfermedades de inmunodeficiencia primaria (es decir, Wiskott-Aldrich, Benta, ALPS) ✓ Sobrepeso ✓ Personas embarazadas y recién embarazadas (durante al menos 42 días después de la finalización del embarazo) ✓ Anemia de células falciformes o talasemia ✓ fumador actual o exfumador ✓ Trasplante de células madre en los últimos 2 años ✓ Accidente/enfermedad cerebrovascular 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Todos los individuos 18+ quién sólo recibió 1 dosis de la vacuna de Covid J&J

Las personas deben hablar con su proveedor de atención médica sobre su afección médica y si es apropiado para ellos recibir una dosis adicional.

Los pacientes pueden optar por mezclar y combinar las dosis de la vacuna de refuerzo COVID-19, utilizando el marco de tiempo de la dosis de refuerzo de su serie original.