Inicie Saludable Vacunas infantiles

EDADES DE VACUNACIÓN 2026

IEHP Inland Empire Health Plan

Los niños necesitan vacunas para protegerlos de enfermedades graves.

Al nacer
- HepB (hepatitis B)

Edad 2 meses
- DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
- IPV (Polio)
- Hib (meningitis por Hib)
- PCV (neumonía)
- RV (rotavirus)

Edad 4 meses
- DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
- IPV (Polio)
- Hib (meningitis por Hib)
- PCV (neumonía)
- RV (rotavirus)

Edad 6 meses
- DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
- IPV (Polio)
- HepB (hepatitis B)
- Hib (meningitis por Hib)
- PCV (neumonía)
- RV (rotavirus)
- Gripe 2 dosis/ intervalo de un mes

Edad 12 meses
- HepA (hepatitis A)
- MMR (sarampión, paperas y rubéola)
- Hib (meningitis por Hib)
- PCV (neumonía)
- Varicela (peste cristal)

Edad 15 meses
- DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)

Edad 18 meses
- HepA (hepatitis A)

Durante el primer año, algunos bebés pueden necesitar una dosis contra el virus sincitial respiratorio (*Respiratory Syncytial Virus, RSV*). Hable con su médico para saber qué es lo mejor para su bebé.

La vacuna contra el COVID-19 se recomienda a partir de los seis meses de edad.

Mantenga a su hijo a salvo de la gripe en el otoño.
Todas las personas a partir de los seis meses de edad deben vacunarse contra la gripe. Para proteger mejor a su hijo, vacúnelo contra la gripe durante la temporada de otoño.

Edad 4 a 6 AÑOS
- **DTaP**
- **Polio**
- **MMR**
- **Varicela**

Edad 11 a 12 AÑOS
- **Tdap**
- **HPV** (2 dosis)
- **Meningitis**

Edad 16 a 18 AÑOS
- **Meningitis**
- **Meningitis B** (2 dosis)

Pregunte a su médico cuánto tiempo debe pasar entre una vacuna y otra. Para obtener más información, visite: ***AAP.org/ImmunizationSchedule***

©2026 Inland Empire Health Plan. Todos los Derechos Reservados. Entidad Pública. HE_26_8134179_SP