

Khởi Đầu Tốt Đẹp

Vắc-Xin Cho Trẻ Em

THỜI ĐIỂM CHỪNG NGỪA NĂM 2026



Trẻ em cần tiêm vắc-xin để được bảo vệ khỏi các bệnh nghiêm trọng.



Trong năm đầu tiên, một số trẻ sơ sinh có thể cần một liều ngừa vi-rút hợp bào hô hấp (respiratory syncytial virus, RSV). Hãy trao đổi với bác sĩ để xem loại nào phù hợp với con quý vị.



Nên tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.

Giữ con quý vị an toàn khỏi bệnh cúm.
Mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên nên tiêm vắc-xin cúm. Để bảo vệ con quý vị một cách tốt nhất, hãy tiêm vắc-xin cúm cho trẻ vào mùa thu.

4-6 TUỔI
DTaP
Bại liệt
MMR
Thủy đậu

11-12 TUỔI
Tdap
HPV (2 liều)
Meningitis

16-18 TUỔI
Meningitis
Meningitis B (2 liều)

Vui lòng hỏi bác sĩ của quý vị về khoảng thời gian cách nhau giữa các loại vắc-xin. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:
AAP.org/ImmunizationSchedule